

XILACINA TRATAMIENTO DE HERIDAS Y COMO RESPONDER

La xilacina es un sedante y tranquilizante no opiáceo que se utiliza con mayor frecuencia en medicina veterinaria y no está aprobado su uso en humanos. Si alguien ha estado consumiendo una sustancia que se sabe que contenía fentanilo y experimenta heridas inexplicables, puede estar relacionado con la xilacina.

- La xilacina puede causar heridas superficiales que pueden aparecer como quemaduras, úlceras o rasguños.
- Las heridas por xilacina pueden desarrollarse en los puntos de inyección y lejos de ellos, a diferencia de los abscesos.
- Las heridas por xilacina pueden seguir desarrollándose cuando se utilizan vías de administración alternativas como la inhalación de vapores ("fumar") o la inhalación.

Las heridas por xilacina pueden tratarse y curarse si se detectan a tiempo. Si no se trata, la herida puede convertirse en tejido necrótico y causar heridas profundas y dolorosas que pueden dar lugar a complicaciones de salud adicionales.

La xilacina se encuentra más a menudo en combinación con un opiáceo y no se ha encontrado en el cannabis, la metanfetamina o la cocaína, a menos que esa sustancia haya sido adulterada con fentanilo.

CUÁNDO BUSCAR ATENCIÓN MÉDICA

- Incapacidad para mover una articulación o disminución de la amplitud de movimiento en el lugar de la herida
- Hueso y/o tendón expuestos
- Síntomas de infección sistémica
- Signos y síntomas de infección local
 - Aumento del dolor, olor, supuración, enrojecimiento, etc.



Ordene Naloxona por correo:
nmharmreduction.org

Encuentre lugares de reducción
de daños en persona:
nmhivguide.org

PUNTOS BÁSICOS PARA EL CUIDADO DE HERIDAS

Mantener limpia la herida

- Con agua y jabón

Mantenga humectado

- Con pomada
antibacteriana o vaselina

Mantener cubierto

- Con vendas limpias o
vendaje Xeroform

**Repita este proceso cada 1-2 días
hasta que se cure. Busque
atención médica si la herida
empeora.**

COMO RESPONDER A UNA SOBREDOSIS

1. Si sospecha que se ha producido una sobredosis relacionada con la xilacina, utilice primero naloxona para responder a la sobredosis de opiáceos y llame al 911. Espere 1-2 minutos y, si la respiración no se ha reanudado, utilice una segunda dosis.
2. Si la persona empieza a respirar de nuevo, vigílela o póngala en posición de recuperación; puede que aún esté sedada por la xilacina.
3. Si la persona no empieza a respirar de nuevo, inicie la respiración artificial hasta que lleguen los servicios de emergencia